

RIOOLOVERSTORT BODEGRAVEN
Interim Evaluatie van het Onderzoek
(komponenten uitgevoerd door H. A. K. bv)

Alexander Klink

RIOOLOVERSTORT BODEGRAVEN
Interim Evaluatie van het Onderzoek
(komponenten uitgevoerd door H. A. K. bv)

Alexander Klink

Inhoudsopgave

1. Componenten van onderzoek	2
2. Methoden	2
3. Voorlopige resultaten en konklusies	4
4. Diskussie en aspecten die voor verder onderzoek in aanmerking komen	6
5. Literatuur	6
Tabel 1: Bodembemonsteringen mp. 1	7
Tabel 2: Bodembemonsteringen mp. 2	8
Tabel 3: Bodembemonsteringen mp. 4	9
Tabel 4: Bodembemonsteringen mp. 5	10
Tabel 5: Palaeolimnologie Chironomidae	11
Tabel 6: Palaeolimnologie kiezelwieren	12
Tabel 6: vervolg	13

Figuren:

1	Fluktuaties in de abundantie van <i>Nitzschia paleacea</i> in de boorkern van Bodegraven	5
----------	---	----------

Riooloverstort Bodegraven september 1985, evaluatie van het onderzoek

1. Componenten van onderzoek

1.1. Tweemaandelijkse inventarisatie van bodembewonende makro-evertebraten op 4 bemonsteringspunten.

1.2. Palaeolimnologisch onderzoek van de makro-evertebraten in een boorkern, gestoken op bemonsteringspunt 2.

1.3. Palaeolimnologisch onderzoek van de kiezelwieren in een boorkern, gestoken op bemonsteringspunt 1.

2. Methoden

2.1. Inventarisatie levende makro-evertebraten.

Tijdens de tweemaandelijkse bemonsteringen zijn levende makro-evertebraten verzameld met behulp van een schepnet met een breedte van 20 cm. De maaswijdte bedraagt 0,5 mm. De bemonsteringen zijn erop gericht om de bodemfauna te verzamelen. De reden hiervoor is dat de bodemfauna reageert op veranderingen in het gehele systeem. Fauna op vegetatie wijzigt zich met de ontwikkelingscyclus van het substraat, terwijl fauna in de oevers slechts inzicht verschaft in het functioneren van deze semi-terrestrische habitat.

Op de 4 bemonsteringspunten is zo zorgvuldig mogelijk de submerse vegetatie verwijderd, waarna een bodemoppervlakte van 0,2 m² tot een diepte van ca. 5 cm is verzameld.

Op de lokatie is dit bodemmateriaal zo goed mogelijk ontwaterd en overgebracht in één of meerdere PVC-potten van 1 ltr. Vervolgens zijn de monsters gekonserveerd met alcohol (85%). In het laboratorium zijn de monsters over 0,5 mm gezeefd. Het materiaal dat op de zeef achterblijft is overgebracht in een emmer, die met water is aangevuld tot een vast volume. Hierna zijn deelmonsters uitgezocht in een zwarte foto-ontwikkelbak. Van de *Oligochaeta* is het totale aantal geschat. De overige diergroepen zijn opnaam gebracht met behulp van stereo- en fasecontrastmikroskoop.

2.2. Palaeolimnologisch onderzoek van makro-evertebraten.

De boorkern is gestoken met een perspex buis, voorzien van een roestvijstalen snijkop. De inwendige diameter bedraagt 42,5 mm. De buis is met een rubber moker zo diep mogelijk in het substraat gedreven. Onder afsluiting met een rubber stop is de buis uit het substraat getrokken.

De buis met materiaal is vertikaal naar het laboratorium vervoerd.

Vervolgens is de buis met inhoud verankerd aan een tafelpoot. Met behulp van een zuiger en een autokrik is de inhoud van beneden naar boven uitgedreven. De sekties zijn gemaakt met een streng van zeer dun ijzerdraad. De op deze wijze verkregen monsters zijn gezeefd over 212µm. Het residue in de zeef is overgebracht in leidingwater. De resten van makro-evertebraten zijn onder een stereo-mikroskoop uitgelezen en overgebracht in buisjes van 1 ml en gekonserveerd met alcohol (70%). Alvorens met de determinatie te starten, is de alcohol vervangen door demi-water. Waar nodig, zijn mikroskopische preparaten gemaakt met glycerine/gelatine/water (7/1/6) als insluitmiddel. Van de verschillende groepen makro-evertebraten die in de monsters zijn aangetroffen zijn slechts de Chironomidae geanalyseerd. Deze familie is gekozen omdat hieruit de meeste informatie kan worden geput. De additionele informatie die aan andere groepen ontleend kan worden, staat niet in verhouding tot de tijdsinspanning.

2.3. Palaeolimnologisch onderzoek aan kiezelwieren.

De buis, gebruikt voor het bemonsteren van de sedimentkern, is dezelfde als beschreven onder 2.2. De monsters, in dit geval 1 cm dik, zijn gezeefd over 150µm. De grove fraktie is met water overgebracht in buisjes van 20 ml en gekonserveerd met formaline (30%) voor eventueel verder onderzoek. De fraktie < 150 µm is in twee stadia bezonken en eveneens overgebracht in 20 ml buisjes. Een bekend volume van deze fraktie is overgebracht op een dekglas. Onder milde verwarming is het demiwater verdampt en het resterende materiaal is ingesloten in clearax®. De determinaties zijn uitgevoerd met behulp van een fasekontrastmikroskoop. Onder een vergroting van 1875 x is een aantal van 100 frustules geteld.

3. Voorlopige resultaten en konklusies

3.1. Tabellen 1 tm. 4

Op alle bemonsteringspunten is een chironomide-fauna aangetroffen die volgens Møller Pillot en Krebs (1981) wateren bewoont met een zeer hoge dynamiek. Deze dynamiek kan worden veroorzaakt door verontreiniging, maar ook door hypertrofie of door verplaatsing van het bodemmateriaal. De chironomiden zijn bestand tegen langdurige lage zuurstofgehalten of hoge concentraties giftige verbindingen (niet nader gespecificeerd).

Aangezien het levende referentiepunt (mp. 8), wat betreft haar chironomide-fauna, niet afwijkt van de overige punten, moet worden gekonkludeerd dat dit punt niet voldoet aan de eis van een relatief ongestoorde situatie.

Veranderingen in de samenstelling van de makro-evertebraten fauna, waarvoor de overstort verantwoordelijk kan worden gesteld, zijn (nog) niet gevonden. Als voornaamste oorzaak moet worden aangenomen dat de dynamiek van de gehele onderzoekslokatie in Bodegraven dermate hoog is dat effecten van overstort hierin een ondergeschikte rol spelen.


3.2. Tabel 5

De thanatocoenose in de drie geanalyseerde sekties vertoont veel overeenkomst met de levende fauna die op alle punten is aangetroffen. Deze faunaresten wijzen derhalve op een bijzonder dynamisch milieu.

De onderste sekte (diepte 27-20 cm) is afgezet in de periode volgend op het graven van de sloten en vijvers in het onderzoeksgebied. Het onderste gedeelte van deze sekte bevat namelijk de minerale ondergrond, bestaande uit gereduceerde klei. De faunasamenstelling wijkt in het geheel niet af van de bovenliggende sekties. Op grond van deze bevindingen moet worden gekonkludeerd dat tijdens het ontstaan van de sloten en vijvers in Bodegraven reeds een zeer hoge millieudynamiek aanwezig was. Bij het analyseren van deze dode referentie kan geen verandering ten opzichte van de huidige situatie worden gevonden. Effecten van overstort zijn in dit palaeolimnologisch onderzoek niet teruggevonden.

3.3. Tabel 6, figuur 1

De diatomeeën-flora in alle sekties wijst op een bèta-alpha mesosaprobe waterkwaliteit (o.a. Mauch, 1976). De diepste sekties wijken hierin niet af van de meest ondiepe sekties. Ook in de soortsaamenstelling zijn geen duidelijke veranderingen opgetreden.



Figuur 1: Fluctuaties in de abundantie van *Nitzschia paleacea* in de boorkern van Bodegraven.

Zoals figuur 1 laat zien, lijkt de stratigrafie in de boorkern weinig storing te hebben ondervonden. Indien we uitgaan van een jaarlijks terugkerende bloei van *Nitzschia paleacea*, dan kan de konklusie worden getrokken dat de onderzoekslokatie is gegraven in het voorjaar van 1978. De verstoring in het piek-dal patroon laat zich vervolgens dateren tussen voorjaar 1981 en voorjaar 1982. Deze verstoring gaat gepaard met zeer lage relatieve dichtheden in frustules van de kiezelwieren per nat monstervolume (semikwantitatief bepaald). De afzettingen op een diepte van 15-25 cm zijn derhalve in een zeer korte tijd tot stand gekomen. Een historisch onderzoek, gekoppeld aan de analyse van de levende kiezelwieren, moet uitwijzen of het aanleggen van de overstort inderdaad voor deze verstoring verantwoordelijk is.

De konklusie die ook bij deze onderzoekscomponent moet worden getrokken is, dat geen wezenlijke veranderingen in de soortsaamenstelling zijn teruggevonden.

4. Diskussie en aspekten die voor verder onderzoek in aanmerking komen

4.1. Onderzoek van levende makro-evertebraten

Voortzetting van de tweemaandelijks bemonsteringen is zinvol. Een volledige jaarcyclus kan informatie verschaffen over de invloed die een groeiend kroosdek heeft op de bentische fauna. Als vervolg kunnen de overstort gebeurtenissen hierop wellicht worden gesuperponeerd. Met name de relatie tussen overstortgebeurtenissen, mikroverontreinigingen en kopafwijkingen bij *Chironomus* wordt als zinvolle onderzoekskomponent gezien. Deze problematiek is in het bovenstaande niet aan de orde gebracht, aangezien de omvang van de gegevens nog te gering is.

4.2. Palaeolimnologisch onderzoek aan makro-evertebraten.

Deze komponent staat nog ter diskussie. Bij andere onderzoekingen uitgevoerd door de auteur, blijkt dat in ondiepe wateren niet mag worden uitgegaan van een ongestoord sedimentatiepatroon. In de boorkern waarvan slechts drie sekties zijn onderscheiden kan de mate van chronologische sedimentatie niet worden vastgesteld. Voorts zij verwezen naar 4.3.

4.3. Palaeolimnologisch onderzoek aan kiezelwieren.

De analyse van veel kleine sekties in de boorkern, geeft de indruk dat een redelijk ongestoorde sedimentatie is opgetreden in grote delen van de boorkern. De konklusies die hieraan zijn ontleend, dienen geijkt te worden met behulp van historische gegevens. Hieruit zal blijken of de verschillende gegevens in overeenstemming zijn met elkaar. Voorts moet de jaarcyclus bepaald worden van de aktuele kiezelwierflora opdat het verloop van de diverse soorten in de boorkern kan worden getoetst aan de feitelijke seizoensfluctuaties.

5. Literatuur

- Mauch, E., 1976.** Leitformen der Saprobität für die biologische Gewässeranalyse. Cour. Forsch. Inst. Senkenberg 21: Teil 2, Schizomycetes-Bacillariophyceae, P: 1-171.
- Moller Pillot, H.K.M. en Krebs, B., 1981.** Concept van een overzicht van de oekologie van Chironomidelarven in Nederland. Stencil P: 1-41.

RIOOLOVERSTORT BODEGRAVEN

Monsterpunt 1	23-10-1984	26-3-1985	23-5-1985	3-7-1985
Bodem bemonsteringen 0,2 M2				
TRICLADIDA				
indet.	0.59			
OLIGOCHAETA				
indet.	59.08	49.65	83.87	88.89
HIRUDINEA				
Erpobdella octoculata	0.89	2.64		
Glossiphonia complanata	0.15	14.18	1.61	
Glossiphonia heteroclita	0.59			
Helobdella stagnalis	1.77	7.80	2.42	
GASTROPODA				
Planorbarius corneus	0.15			
Planorbis (Anisus) vortex	0.74			
Valvata piscinalis			3.23	2.78
BIVALVIA				
Pisidiidae			1.61	
AMPHIPODA				
Gammarus spec.	0.15			
ISOPODA				
Asellus aquaticus	23.93	7.80	2.42	
EPHEMEROPTERA				
Caenis horaria	0.30	0.71	1.61	
CERATOPOGONIDAE				
indet.	0.30	1.42	1.61	
CHIRONOMIDAE, TANYPODINAE				
Anatopynia plumipes	0.15			2.78
Psectrotanypus varius	5.17	9.22	0.81	5.56
CHIRONOMINAE, Chironomini				
Chironomus gr. plumosus	5.47	6.38	0.81	
Dicrotendipes notatus	0.44			
Parachironomus gr. arcuatus	0.15			
Parachironomus gr. vitiosus				2.78
SYRPHIDAE				
Eristalis spec.		0.71		
Totaal aantal individuen in percent	100	100	100	100
Totaal aantal individuen/ M2	3385	710	620	185
Totaal aantal taxa	17	10	10	5
Perc. afw. Chironomus	11	33	0	0

RIOOLOVERSTORT BODEGRAVEN

Monsterpunt 2 Bodemmonsteringen 0,2 M2	23-10-1984	28-3-1985	23-5-1985	3-7-1985
TRICLADIDA				
indet.	0.21			
OLIGOCHAETA				
indet.	49.28	33.33	11.28	54.37
HIRUDINEA				
Erpobdella octoculata	0.21	1.39		
Glossiphonia complanata	0.21	1.39		
Glossiphonia heteroclita	0.21	1.39	0.50	
Helobdella stagnalis	0.41	1.39		0.97
GASTROPODA				
Bythinia tentaculata	1.23	4.17	27.32	5.83
Planorbis cornutus	3.90		0.25	1.94
Planorbis (Bathyomphalus) contortus			0.25	
Planorbis (Gyraulus) albus		6.94	29.82	2.91
Valvata piscinalis	2.46	5.56	16.79	3.88
BIVALVIA				
Pisidae	2.26	4.17	0.75	
AMPHIPODA				
Gammarus spec.			0.25	
ISOPODA				
Asellus aquaticus	14.78	8.33	8.77	9.71
EPHEMEROPTERA				
Cloeon dipterum	1.64	5.56	0.25	
HETEROPTERA				
Corixidae I.			0.25	
COLEOPTERA				
Dytiscidae I.			0.25	
Halipus lineatocollis im.	0.21			
Halipus spec. I.	0.21		1.75	
Halipus spec. im.	0.21			
CERATOPOGONIDAE				
indet.	0.21	2.78		
CHABORIDAE				
Chaoborus flavicans	0.21	2.78		
LIMNOBIIDAE				
indet.	0.21			
CHIRONOMIDAE, TANYPODINAE				
Anatopynia plumipes	0.21			4.85
Clinotanypus nervosus	0.21			
Procladius spec.				0.97
Psectrotanypus varius	4.93	5.56	0.50	0.97
Tanypus kraatzi	1.03	2.78		8.74
ORTHOCLADIINAE				
Cricotopus silvestris			1.00	
CHIRONOMINAE, Chironomini				
Chironomus gr. plumosus	15.61	12.50	0.25	1.94
Dicrolindipes gr. nervosus				1.94
Parachironomus gr. vitiosus				0.97
Totaal aantal individuen in percent	100	100	100	100
Totaal aantal individuen/ M2	2435	360	2000	515
Totaal aantal taxa	23	16	17	14
Perc. afw. Chironomus	11	11	0	0

RIOOLOVERSTORT BODEGRAVEN

Monsterpunt 4	23-10-1984	28-3-1985	23-5-1985	3-7-1985
Bodemmonsteringen 0,2 M2				
OLIGOCHAETA				
indet		56.00	80.42	16.33
HIRUDINEA				
Erpobdella octoculata		5.33		2.04
Glossiphonia complanata		1.33	2.29	16.33
Glossiphonia heteroclita		1.33		
Helobdella stagnalis		10.67	0.88	
GASTROPODA				
Bythinia tentaculata		2.67	0.88	
Planorbis (Gyraulus) albus				2.04
Planorbarius corneus			0.18	
Valvata piscinalis				3.06
BIVALVIA				
Pisidiidae				2.04
ISOPODA				
Asellus aquaticus		13.33	4.76	38.78
EPHEMEROPTERA				
Caenis horaria		1.33	0.18	
Cloeon dipterum		1.33		
COLEOPTERA				
Haliphus spec. I.		1.33	1.23	5.10
Hyphydrus ovatus I.				2.04
DIPTERA				
indet.			0.18	
CHIRONOMIDAE, TANYPODINAE				
Anatopynia plumipes		2.67	0.53	
Psectrotanypus varius		1.33	3.17	6.12
ORTHOCLADIINAE				
Cricotopus silvestris			0.53	
CHIRONOMINAE, Chironomini				
Chironomus gr. plumosus		1.33	4.76	3.06
CHIRONOMINAE, Tanytarsini				
Tanytarsus spec.				3.06
Totaal aantal individuen in percent		100	100	100
Totaal aantal individuen/ M2		375	2835	490
Totaal aantal taxa		13	13	12
Perc. afw. Chironomus		1	0	0

RIOOLOVERSTORT BODEGRAVEN

Monsterpunt 8	23-10-1984	28-3-1985	23-5-1985	3-7-1985
Bodemmonsteringen 0,2 M2				
OLIGOCHAETA				
indet.	65.19	94.40	55.78	59.70
HIRUDINEA				
Glossiphonia complanata				1.49
Glossiphonia heteroclita	0.13		0.51	
GASTROPODA				
Lymnaea peregra			7.65	8.21
Planorbarius corneus	0.26		0.17	
Planorbis planorbis				1.49
Theodoxus fluviatilis			0.17	
Valvata piscinalis	0.13	0.29	0.17	17.16
BIVALVIA				
Pisidae	3.26	0.29	2.89	0.75
ISOPODA				
Asellus aquaticus	0.26		2.55	0.75
EPHEMEROPTERA				
Caenis horaria	0.78		0.85	
Cloeon dipterum	2.09		1.36	
HETEROPTERA				
Corixidae l.			1.02	0.75
Notonecta spec. l.			0.34	
COLEOPTERA				
Dytiscidae l.				0.75
Helophilus spec. l.			0.34	
Hyphydrus ovatus			0.17	
DIPTERA				
indet.		0.29		
CERATOPOGONIDAE				
indet.	1.30	0.29	0.51	0.75
LIMNOBIIDAE				
indet.	0.26			
CHIRONOMIDAE, TANYPODINAE				
Anatopynia plumipes	0.13		5.10	0.75
Clinotanypus nervosus			0.17	
Monopelopia tenuicalcar	0.13		0.17	2.24
Procladius spec.			0.17	
Psectrotanypus varius	3.26	3.54	7.48	2.24
Tanytus kraatzi	0.39	0.29	1.02	
ORTHOCLADIINAE				
Bryophaenocladus gr. muscicola				1.49
Corynoneura gr. scutellata			6.29	
Cricotopus silvestris			0.85	
Psectrocladius gr. sordidellus	0.13			
CHIRONOMINAE, Chironomini				
Chironomus gr. plumosus	22.29	0.59	1.87	
Dicrotendipes gr. nervosus				1.49
Parachironomus gr. arcuatus			2.04	
CHIRONOMINAE, Tanytarsini				
Tanytarsus spec.			0.17	
STRATIOMYIDAE				
indet.			0.17	
Totaal aantal individuen in percent	100	100	100	100
Totaal aantal individuen/ M2	3835	1695	2940	670
Totaal aantal taxa	16	8	27	15
Perc. afw. Chironomus	10	0	0	0

RIOOLOVERSTORT BODEGRAVEN

Riooloverstort Bodegraven			
Palaeolimnologie 23-10-1984			
Monsterpunt 2			
Diepte	27-20 cm	20-10 cm	10- 0 cm
Nat monstervolume in ml	99	142	142
AANTAL CHIRONOMIDAE IN PERCENT			
TANYPODINAE:			
Indet.	1.7	2.0	
Anatopynia plumipes			0.5
Monopelopia tenuicalcar	5.6	2.0	0.5
Procladius spec.	2.2	1.5	0.5
Psectrotanypus varius	3.4	3.5	5.3
Tanypus kraetzi	1.1	1.5	4.0
ORTHOCLADIINAE:			
Acricotopus lucens	3.9	2.0	5.5
Bryophænocladus gr. muscicola			0.5
Cricotopus sg. Isocladus	7.9	26.0	29.0
Metriocnemus gr. hirticollis		1.0	1.0
CHIRONOMINAE, CHIRONOMINI:			
Chironomus spec.	41	36.0	28.3
Cryptochironomus spec.		0.5	
Demetjerea rufipes		1.0	0.5
Dicretotendipes notatus	6.7	4.3	5.8
Endochironomus albipennis		1.0	
Endochironomus tendens	7.3	1.0	
Glyptotendipes gr. pallens	5.7	4.3	10.5
Parachironomus gr. arcuatus	1.1	4.0	5.6
CHIRONOMINAE, TANYTARSINI:			
indet.	12.4	8.5	2.5
TOTAAL IN PERCENT	100	100	100
TOTAAL AANTAL INDIVIDUEN/MONSTER	89	580	450
TOTAAL AANTAL INDIVIDUEN/ML	0.90	4.08	3.17
TOTAAL AANTAL TAXA	13	17	15
AFWIJKINGEN CHIRONOMUS SPEC.	1	10	12
PERCENTAGE AFWIJKINGEN CHIRONOMUS	1.37	6.94	11.01

Diepte per cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Diatomeeen																				
Nitzschia paleacea	11	16	16	27	3	3	20	20	4	3	4	27	26	21	3		4	8	4	8
Cooponeis placentula	10	18	17	6	13	4	14	13	33	36	16	4	7	2	10	12	15	4	10	23
Stephanodiscus hantzschii	18	14	10	10	8	15	13	8	8	4	6	7	8	19	6	1	6	4	7	3
Navicula hungarica v. capitata	9	3	6	6	13	10	3	2	4	2	15	11	9	7	5	5	9	3	17	11
Achnanthes lanceolata	7	3	4	1	12	12	6	4	12	11	7	1	5	11	13	8	10	9	4	4
Navicula cryptocephala	7	8	5	3	5	8	6	6	1	2	6	4	8	11	7	5	5	13	6	3
Cyclotella meneghiniana	3		5		1		4	5	2	7	3	4	4	5	7	8	10	4	5	4
Achnanthes hungarica	6	8	8	14	8	4	3	1	2	7	2	4	5	1	10	3	7	5	6	4
Navicula near simplex	1	5	3	5	3	6	4	4			2	6	3	5	5	4	1	6	5	
Navicula cf. seminulum	2	4	7	10	10	15	6	3	2	4	5	1	1	2	3			1	3	
Gomphonema parvulum	7	4	3	3	5	4	1	5	1	1	2	2	3		4	4	4	2	3	3
Surirella ovata	1	1	1					1				1	2	2	1	6	1	12	1	1
Nitzschia angustata			1	3	1		1					1			1	1	6	7	2	3
Navicula cf. minima			1	1	2	4	1		2		1	4	3	2	6			2	1	3
Melosira spec.		2	2		1			1	5			2	1		2	3	4	2	1	
Fragilaria construens						1			2		1			1	3		2		2	2
Amphora veneta				1		1	1	1	2		1		1		2	4	2		3	2
Navicula rhynchocephala	2	2	1			1		1	1		1	1		1	3		1	2	1	4
Navicula salinarum								1			7	3				2		1		1
Nitzschia amphibia							4	1	8	3	1				4			1	1	1
Nitzschia indet.	2	1		1	4	2	4	3	1	4	2		1	1	1	1		1	1	1
Amphora ovalis	2	2					2	2	5	3	2		1			1				
Rhoicosphaenia curvata							2	2	2	1	3	1		1					1	2
Synedra pulchella			1				1	3		1		1	1	1	1	1		1	3	
Amphora perpusilla								2	5	1				1						
Navicula peregrina f. minor			2	1	1	2	1							1		3		2		
Navicula pupula		1				1			1			3	2				2			
Navicula radiosa			1						1			1			1					
Stephanodiscus astraea v. minutula	1		1				1			2						1			1	
Tabellaria flocculosa																4				
Synedra ulna	1	1						1									3		1	1
Nitzschia palaea	1	2	1				1				1			1				2		1
Synedra tabulata	2		1				1	1						1		1				1
Navicula cf. pelliculosum		1	1	1	1		1	1				1	2	1						
Cymbella ventricosa									1	1			2	1	1					
Navicula spec. 1					1			1	1	1		2								
Cumatocira belgica	1					1			1	1	1					1			1	1
Gomphonema olivaceum				1	2	1	1			1	1								1	1
Navicula pugmaea		1	1	1	1	1			1							3	1			
Epithemia turgida	1														2			1		2
Fragilaria capuchina					1	2	1		1	1		1	1		1				1	
Fragilaria pinnata																1			1	
Gyrosoma acuminatum					1												1	1		2

Nitzschia thermalis																2				1
Nitzschia triblionella v.				1								1	1	1			1			1
Navicula indet.	1	1		1	1	1						4	2	1	1			1		1
Navicula cryptocephala v. veneta																				
Navicula cineta															1	1				1
Navicula salinarum v. capitata	1					1		1					2							
Coscinodiscus cf. perforatus						1		1												1
Stephanodiscus astraea									1	1						1	2			
Caloneis silicola					1				1									1		
Cumatopleura solea																	1			
Diatoma vulgare								1									1			
Gomphonema acuminatum							2	1			1									
Pinnularia borealis				1																1
Achnanthes delioatula			1	1							1	1								
Epithemia zebra v. saxonica																				
Nitzschia recta																		1		
Raphoneis surirella																	1		1	
Stauroneis anceps				1									1							1
Achnanthes minutissima	2							1												
Coscinodiscus laeustris										1	1					1				
Diploneis interrupta																				
Gomphonema angustatum		1																		1
Navicula spec. 2																	1			
Pinnularia indet.																				
Synedra rumpens									1								1			
Actinopteryx undulatus								1												
Navicula cuspidata																				1
Nitzschia acicularis	1	1																		
Nitzschia frustulum								1			1									
Nitzschia gandersheimiensis																1		1		
Pinnularia microstauron																				
Cooponeis pediculus					1															
Coscinodiscus cf. kützingi																				1
Cyclotella compta															1					
Cyclotella kützingiana																				
Cyclotella stelligera															1					
Cyclotella striata																				
Fragilaria intermedia																				
Navicula mutica v. binodes																				
Navicula rotunda														1						
Navicula simplex														1						
Nitzschia hungarica																		1		
Raphoneis amphioeros																				
Rhopalodia gibba																				

Aantal individuen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Aantal taxa	25	23	25	23	25	23	25	31	28	20	31	26	28	28	28	32	27	29	30	34

Biodegradation MP, 1.28-3-1985	Diaple per cm	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	TOTAL
Nitzschia palaeacea	3	5	7	7	2	10	8	17	22	17	11	8	20	17	15	12	19	18		
Cocconeis placentula	26	2	1	12	15	6	6	7	9	13	11	4	10	8	4	13	6	6	4	
Stephanodiscus hantzschii	4	2	1	2	3	3	3	1	9	5	10	10	4	4	4	5	7	10	11	
Nitzschia thiermannii	4	6	5	8	12	6	6	7	3	5	6	4	3	2	2	5	7	8	6	
Nitzschia thiermannii	4	4	4	9	9	6	6	9	7	8	9	6	6	6	6	6	8	8	6	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6	6	6	7	9	9	7	7	9	9	9	9	9	9	9	
Nitzschia thiermannii	5	5	5	6	6</															

